

Eyðmerking av AGD

AGD (Amoebic Gill Disease) eru amøbur (skaploysingar), ið festa seg á tákstur, og harvið minka um iltupptøkuna hjá smittaða fiskinum. Hvussu illa fongdar táksturnar á fiskinum eru, kann býttast upp í seks stig (0-5). Har tákstur uttan sjónlig tekin um amøbur fáa metingina **stig 0**. **Stig 1** tákstur sýna fyrstu tekin um smittuna. Á **stig 2** tákstum hava amøburnar veruliga fest seg, og økini eru vorðin størri og fleiri. Á **stig 3** tákstum byrja amøburnar at spjaða seg tvørtur um allan tákstribogan. Á **stig 4** tákstum hava amøburnar spjatt seg um allan tákstribogan, og fjala upp til 50% av tákstribognum. **Stig 5** tákstur eru mestsum undir í amøbum. Vanligt er, at fyrstu teknini uppá AGD (stig 1 og 2) eru at finna nær við tákstribogafestið. Týðningarmikið er tí at kann hesi økir væl. Hóast hetta kunnu tað vera aðrir tákstribogar, ið fyrst verða verri fongdir (stig 3-5). Hvussu illa fongdar táksturnar eru, verður mett út frá ringast fongda tákstribognum. Reytt doyvingarvatn (blóð), kann vera ábending um AGD.

